



Obstrução de via aérea superior secundário a vasculite por levamisole em usuário de cocaína

Tema: Medicina

LUIS AUGUSTO ROVELA JUNIOR; GREGORY SARAIVA MEDEIROS; VITORIA HOMEM MACHADO; PAULA MARQUES PRATES BEHRENS; JUÇARA GASPARETTO MACCARI; EUBRANDO OLIVEIRA; ROSELAINÉ PINHEIRO OLIVEIRA; CASSIANO TEIXEIRA

Hospital Moinhos de Vento
Porto Alegre/RS

Introdução e objetivos: Relato: masculino, 39 anos, pardo, casado, ocupação remunerada, ensino médio completo, obesidade grau 2, síndrome de apneia obstrutiva do sono, vasculite por levamisole diagnosticada há 6 meses (p ANCA: 1:1640 e antimieloperoxidase positivo), tabagista 40 cigarros/dia (40 maços-ano), consumo diário de cocaína (em torno de 100 R\$/dia), nega uso de bebida alcoólica. Procurou emergência por história de dispneia em repouso de evolução há 04 semanas, com piora importante nas últimas 24h. Negava febre, tosse ou expectoração purulenta. Havia procurado atenção médica por duas vezes nas últimas 4 semanas tendo sido diagnosticado como infecção de via aérea superior (tratamento com Amoxicilina+Clavulonato e Cefuroxima). Relato de uso de cocaína em grande quantidade 72h antes da admissão (triplo do habitual). Na admissão, apresentava estridor e sinais de insuficiência ventilatória tendo sido manejado com hidrocortisona 100mg intravenoso e nebulização com adrenalina 1mg, sem sucesso. Transferido para o Centro de Terapia Intensiva 2 horas após a admissão hospitalar em uso de máscara com reservatório. Realizada intubação orotraqueal com grande dificuldade técnica. Chamava atenção inúmeras lesões ulcerativas no dorso de ambos os pés e nas pernas. Submetido a videolaringoscopia que diagnosticou lesões ulcerativas na laringe e TC de pescoço com proeminência da região glótica e supraglótica e aumento das partes moles. Mantido com corticóide 1,5mg/Kg. Submetido a traqueostomia 48h após a admissão.

Resultado e Discussão: A adição de levamisole na cocaína dá uma aparência mais pura à droga e produz efeitos semelhantes aos anfetamínicos. Trata-se do segundo caso descrito de obstrução da via aérea superior.

Conclusão: A contaminação da cocaína por levamisole expande a abordagem da intoxicação aguda nas salas de emergência para além das associações frequentes como overdose.