



FUNCIONALIDADE DO PACIENTE CRÍTICO COM ESCALA DE ESTADO FUNCIONAL NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CANOAS

Tema: Fisioterapia

JULIANA BUENO COMERLATO; TAINÁ BARROS RODRIGUES; LAURA JUREMA DOS SANTOS NORONHA;

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS
CANOAS/RS

Introdução: Frequentemente os pacientes críticos internados na unidade de terapia intensiva (UTI) são expostos a longos períodos de imobilização e restrição ao leito, ocasionando perda de força muscular, déficits funcionais e redução da qualidade de vida. A funcionalidade é extremamente afetada no período de estadia do paciente na UTI, devendo ser avaliada e mensurada de forma adequada e utilizada para determinar a melhor estratégia de reabilitação para cada paciente. **Objetivo:** Avaliar a funcionalidade do paciente durante a internação na UTI através da Escala Functional Status Score for the ICU (FSS-ICU). **Material e Métodos:** Pesquisa quantitativa de coorte prospectiva, realizada no período de março de 2017 a julho de 2018 no Hospital Universitário, onde os pacientes foram avaliados através da escala FSS-ICU no momento da admissão e na alta da UTI. A análise estatística foi realizada através do teste não paramétrico de Friedman no SPSS (versão 21.0). **Resultados:** Foram incluídos no estudo 75 pacientes. A mediana de idade encontrada foi de 63 anos, com um predomínio do sexo masculino (68%). O tempo mediano de internação hospitalar foi de 28 dias e o tempo mediano de permanência na UTI foi de 4 dias. Em relação à aplicação da escala FSS-ICU, no momento da admissão obteve-se um escore mediano de 13 pontos e, no momento da alta, foi de 24 pontos (p