



XI CONGRESSO GAÚCHO DE Terapia Intensiva

25 a 27 de Agosto de 2022

Hotel Dall'Onder
Bento Gonçalves - RS



100

Constipação intestinal e a relação com desfechos clínicos em pacientes críticos com COVID-19

Tema: Nutrição

Categoria: Caso-controle

Debora Comparin; Thaís Rodrigues Moreira;

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Porto Alegre/RS

Introdução: A constipação intestinal caracteriza-se por ausência evacuatória ou infrequência de evacuações, condições frequentes em pacientes críticos, associadas a desfechos de mortalidade, maior tempo em ventilação mecânica invasiva (VMI) e permanência prolongada em unidade de terapia intensiva (UTI). **Objetivo:** Avaliar a constipação intestinal nos pacientes críticos com COVID-19 e relacionar com os desfechos clínicos encontrados nesta população. **Materiais e Métodos:** Coorte retrospectiva realizada entre abril e agosto de 2021, com 114 pacientes internados em UTIs com idade ≥ 18 anos. Observamos os desfechos óbito e alta, tempo de VMI, tempo de internação em UTI, em enfermaria, uso de medicamentos e terapia nutricional enteral (TNE). Consideramos constipação quando houvesse ausência evacuatória por tempo ≥ 6 dias. Os dados demográficos e clínicos foram coletados via prontuário eletrônico. Consideramos significativos os resultados cujo p-valor

REALIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO



sotirgs@officeeventos.com.br